



ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата
для медицинского применения
АСКОРУТИН

Регистрационный номер: ЛСР-007344/09
Торговое название: Аскорутин
МНН или группировочное название: Аскорбиновая кислота+Рутозид
Лекарственная форма: таблетки.
Состав: Каждая таблетка содержит **Активных веществ:** аскорбиновой кислоты 50,0 мг и рутозида в пересчете на безводное вещество 50,0 мг.
Вспомогательные вещества: сахара – 185,7 мг, крахмал картофельный – 38,7 мг, повидон-К25 – 3,5 мг, кальция стеарат – 2,1 мг.
Описание: Таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с незначительными вкраплениями, плоскоцилиндрической формы с риской с одной стороны и фаской с двух сторон.
Фармакотерапевтическая группа: Витамин.
Код АТХ: С05СА51
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Аскорбиновая кислота участвует

ет в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма.
Рутозид (производное рутина) устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшая ее отёчность и воспаление. Обладает антиагрегантным действием, что способствует улучшению микроциркуляции.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Гиповитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности; при геморрагическом диатезе.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонно-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»



стью к тромбозам, тромбофлебит.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутри по 1 таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема пищи. Курс лечения 2-3 недели.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства, головная боль.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа: снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.
ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки.
По 10, 25 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
По 10, 20, 30, 40, 50 или 100 таблеток в контейнер полимерный для лекарственных средств. Свободное пространство в контейнере заполняют ватой медицинской гигроскопической.
Один контейнер или 1, 2, 3, 4, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок
вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности.
3 года. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек.
Без рецепта.
Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11.
Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий): 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.
Тел./факс: (84862) 3-41-09.