



ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МЕТИОНИН

Регистрационный номер: ЛС-001630

Торговое название: Метионин

Международное непатентованное название (МНН): Метионин (Methionine)

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав

Активное вещество: метионин 250 мг.

Вспомогательные вещества (ядро): крахмал картофельный - 13,99 мг, метилцеллюлоза - 2,36 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 60,35 мг, стеариновая кислота - 3,30 мг.

Вспомогательные вещества (оболочка пленочная): гипромеллоза - 5,367 мг, титана диоксид - 2,43 мг, краситель азорубин - 0,003 мг, полисорбат-80 - 1,20 мг, повидон (поливинилпирролидон) - 1,00 мг.

Описание

Таблетки круглые, двояковыпуклой формы, без риски, покрытые пленочной оболочкой розового или светло-розового цвета. На поперечном срезе видны два слоя - ядро белого или почти белого цвета и пленочная оболочка розового или светло-розового цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Метаболическое средство

Код АТХ

A05BA

Фармакодинамика

Оказывает метаболическое, гепатопротекторное действие. Метионин — незаменимая аминокислота — необходима для синтеза холина, с дефицитом кото-

рого связано нарушение синтеза фосфолипидов из жиров и отложение в печени нейтрального жира.

Является донатором метильной группы. Участвует в биосинтезе карнитина, цистеина, таурина, лецитина, фосфатидилхолина и других фосфолипидов. Нарушение биотрансформации метионина может привести к атеросклерозу.

Метионин является одной из важнейших аминокислот, необходимых для биосинтеза белка.

Необходим для дезинтоксикации некоторых ксенобиотиков.

Фармакокинетика

Легко всасывается из кишечника. С мочой выводится в небольшом количестве.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В составе комплексной терапии: заболевания печени, протекающие с жировой инфильтрацией гепатоцитов — токсический гепатит, гепатоз (в т.ч. алкогольный), цирроз печени легкой и средней степени тяжести.

Профилактика токсических поражений печени мышьяком, хлороформом, бензолом.

В составе комбинированной терапии: дефицит белка различного происхождения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Вирусный гепатит, тяжелая печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия, гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до

6 лет.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Почечная недостаточность (опасность нарастания гиперазотемии).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Исследований, подтверждающих безопасность метионина для плода при применении его в период беременности и безопасность для ребенка при применении в период грудного вскармливания, не проводилось.

Применение препарата при беременности и в период кормления грудью возможно только по назначению врача в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, за 30-60 минут до еды.

Взрослым - по 500-1500 мг 3-4 раза в день.

Детям старше 6 лет по 250-500 мг 3-4 раза в день.

Курс лечения 10-30 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции, тошнота, рвота.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы: снижение артериального давления, тахикардия, спутанность сознания.

Лечение: симптоматическое.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Взаимодействия с лекарственными препаратами не описаны.

Применение метионина в сбалансиро-

ванном соотношении с другими аминокислотами предупреждает его токсическое действие.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Несбалансированное применение метионина в больших дозах может оказать повреждающее действие на клетки печени и других органов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг.

По 10, 25 или 50 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 10, 20, 30, 40, 50 или 100 таблеток в контейнер полимерный для лекарственных средств.

Один контейнер или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Юридический адрес: 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Песочная, 11.
Адрес для переписки (фактический адрес, в том числе для приема претензий):
445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Гидростроителей, 6.

Тел./факс: (84862) 3-41-09.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»