

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения ИБУПРОФЕН

Регистрационный номер: ЛП-002969

Торговое название: Ибупрофен

Международное непатентованное
название: ибупрофен

Лекарственная форма: гель для наружного
применения

Состав на 100 г геля:

Активное вещество: ибупрофен - 5,0 г.

Вспомогательные вещества: изопропанол – 5,0 г; гизтеллоза – 1,8 г; натрия гидроксид – 1,0 г; бензиловый спирт – 1,0 г; вода - 86,2 г.

Описание: прозрачный или слабо
опалесцирующий бесцветный однородный
гель с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа:
нестероидный противовоспалительный
препарат (НПВП).

Код АТХ: M02AA13

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Препарат относится к нестероидным
противовоспалительным препаратам
(НПВП). Оказывает обезболивающее и
противовоспалительное действие. Неизби-
рательно блокирует обе циклооксигеназы
(ЦОГ-1 и ЦОГ-2). Механизм действия
обусловлен торможением синтеза
простагландинов — медиаторов боли и
воспаления.

Фармакокинетика

Препарат используется только для местного
применения. При нанесении на кожу через
24 часа обнаруживается в эпидерме и
дерме и составляет около 5% от concentra-
ции препарата при приеме внутрь.
Терапевтическая концентрация достигается
местно, системного всасывания не происхо-
дит.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мышечные боли, боли в спине, артриты,

повреждения связок, растяжения, спортив-
ные травмы и невралгия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- гиперчувствительность к ибупрофену или другим компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП;
- полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВП (в том числе в анамнезе);
- нарушения целостности кожных покровов в месте нанесения препарата (в том числе, инфицированные ссадины и раны, мокнувшие дерматозы, экзема)
- детский возраст до 12 лет;
- беременность III триместра.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

С осторожностью применяют препарат при
сопутствующих заболеваниях печени или
почек, желудочно-кишечного тракта; при
бронхиальной астме, крапивнице, рините,
полипах слизистой оболочки полости носа,
при беременности и в период кормления
грудью.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

С осторожностью назначают препарат при
беременности (I-II триместры) и в период
грудного вскармливания. На поздних сроках
беременности (III триместр) препарат
противопоказан.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Только для наружного применения.
Препарат назначают взрослым и детям
старше 12 лет.
По 4–10 см препарата (эквивалентно 50 –
125 мг ибупрофена) нанести на кожу над
областью поражения и аккуратно втереть до
полного впитывания. Повторное использо-
вание возможно через 4 ч, не более 4 раз в

течение 24 ч.

Если симптомы сохраняются или усугубля-
ются или не наблюдается улучшения после
2 недель применения, необходимо
прекратить лечение и обратиться к врачу.

После использования следует тщательно
вымыть руки.

Не следует превышать указанную дозу.

Применять в минимально эффективных
дозах минимально коротким курсом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Реакции гиперчувствительности:
неспецифические аллергические реакции и
анафилактические реакции, реакции со
стороны дыхательных путей: астма (в том
числе, ее обострение), бронхоспазм,
одышка, отек Квинке, кожные реакции в
месте нанесения геля: крапивница, сыпь,
гиперемия кожи, ощущения жжения или
покалывания.

Нарушения со стороны желудочно-кишечно-
го тракта, при случайном приеме внутрь:
боли в животе, диспепсия.

При длительном применении возможно
развитие системных побочных эффектов
НПВП.

При появлении побочных эффектов следует
прекратить прием препарата и обратиться к
врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Явления передозировки при наружном
применении не установлены.

В случае если препарат случайно был
принят внутрь, рекомендовано промывание
желудка (только в течение часа после
приема), активированный уголь, щелочное
питье, форсированный диурез, симпатиче-
ская терапия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАР- СТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Лекарственное взаимодействие препарата
ибупрофен в форме геля до настоящего

времени не описано. Однако даже при
наружном применении ибупрофен может
оказывать системное действие, следова-
тельно, теоретически, одновременное
использование геля с другими НПВП может
привести к усилению побочных явлений.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

После применения препарата следует
тщательно вымыть руки.

Необходимо избегать попадания геля в
глаза и на губы. Нельзя наносить гель на
поврежденные участки кожи, а также на
область вокруг глаз и губ.

Не применять в сочетании с окклюзионной
(герметичной) медицинской повязкой.

Избегать чрезмерного попадания
солнечных лучей на область лечения.

Влияние на способность управлять
автотранспортом и работать с механизмами
Применение геля Ибупрофен не оказывает
влияния на деятельность управляющую
повышенного внимания, координацию
движений, высокой скорости психических и
физических (в т.ч. у водителей транспорта,
лиц, обслуживающих машины) реакций.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель для наружного применения 5 %.

По 20, 30, 50 или 100 г в тубы алюминиевые.
Каждую тубу вместе с инструкцией по
применению помещают в картонную
упаковку (пачку) из картона для потреби-
тельской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при темпера-
туре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать препарат после истечения
срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11
Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий):
445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6
Тел./факс: (84862) 3-41-09, 7-18-51
E-mail: ozon_pharm@samtel.ru
www.ozonpharm.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»

