Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/ использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации изложенные в инструкции.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ОКСОЛИН

Регистрационный номер:

ПП-001643

Торговое название препарата:

Оксолин

название (МНН) или группировочное название: Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

зальная Состав:

В 100 г мази содержится

Активное вещество: диоксоте- дится в основном почками в течетрагидрокситетрагидронафталин ние суток. – 0,25 г.

Вспомогательные вещества: парафин жидкий (масло вазелиновое) – 0,5 г; вазелин – 99,25 г.

цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа: Детский возраст до двух лет. противовирусное средство.

Код ATX: J05AX

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙ-СТВИЕ

Обладает противовирусной активностью. блокируя места связывания Международное непатентованное вируса гриппа с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Фармакокинетика

Лекарственная форма: мазь на- - всасывание: при нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20 % препарата.

В организме не кумулирует и выво-

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Описание: Мазь светло-желтого Индивидуальная непереносимость препарата и его компонентов.

с осторожностью

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕНности и в период грудного

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»



ВСКАРМЛИВАНИЯ

Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно только в том случае, когда предпоплода и ребенка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

лоской мази длинной от 3 до 5 мм вые. Лечение вирусного ринита: поло- ную упаковку (пачку). ской мази длиной от 3 до 5 мм сма- По 20, 30, 40 банок вместе с рав-

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При применении мази оксолина в рованного. некоторых случаях наблюдается быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки лекарствен- Хранить в недоступном для детей ного препарата Оксолин, мазь назальная, неизвестны.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 2 года. Не использовать после исте-ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТА- чения срока годности. МИ

Взаимодействие с другими лекар- Без рецепта. ственными средствами не описано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Информация о неблагоприятном влиянии лекарственного препарата на способность управлять транслагаемая польза для матери пре- портными средствами и работать с вышает потенциальный риск для механизмами не зарегистрирована. ФОРМА ВЫПУСКА

Мазь назальная 0,25 %.

Местно. Профилактика гриппа: по- По 10, 25 или 30 г в тубы алюминие-

смазывают ежедневно 2-3 раза в По 5, 10, 15, 20, 25 или 30 г в банки день слизистую оболочку носа в типа БТС оранжевого стекла с натяпериод подъема и максимального гиваемыми крышками. На банку наразвития эпидемической вспышки клеивают этикетку самоклеящуюся. гриппа (на протяжении 25 дней) или Каждую тубу вместе с инструкцией при контакте с больным гриппом. по применению помещают в картон-

зывают слизистую оболочку носа ным количеством инструкций по 2-3 раза в день в течение 3-4 дней. применению помещают в коробку из картона коробочного или гофри-

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 10

месте.

Срок годности

Условия отпуска

Юридический адрес: 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Песочная, 11. Адрес для переписки (фактический адрес, в том числе для приема претензий): 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Гидростроителей, 6. Тел./факс: (84862) 3-41-09.

